

4.2.28 - LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLARIN KULLANIM İLKELERİ

4.2.28.A - Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)

Statinler	LDL düzeyi	Risk Faktörü	Hiper tansiyon		TAHLİL	EK KOŞUL	RAPOR (uzman raporu)	reçete
			65 yaş ve üstü					
			Ailevi erken kardiyovasküler hastalık					
	LDL >190 mg/dL		yok		son 6 ay içinde en az 1 hafta arayla yapılan 2 tahlilinde yüksek olması	yok	uzman hekim	tüm hekimler
	LDL >160 mg/dL		en az 2		son 6 ay içinde en az 1 hafta arayla yapılan 2 tahlilinde yüksek olması	yok	uzman hekim	tüm hekimler
	LDL >130 mg/dL		en az 3		son 6 ay içinde en az 1 hafta arayla yapılan 2 tahlilinde yüksek olması	yok	uzman hekim	tüm hekimler
	LDL >70 mg/dL		yok		son 6 ay içinde tek tahlil sonucu yeterli	Diabetes mellitus veya Akut koroner sendrom veya Geçirilmiş MI veya Geçirilmiş inme veya Koroner arter hastalığı veya Periferik arter hastalığı veya Karatid arter hastalığı veya Abdominal aort anevrizması	uzman hekim	tüm hekimler
						Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri Atorvastatin 40 mg ve üzeri Simvastatin 40 mg ve üzeri Pravastatin 40 mg ve üzeri Fluvastatinin 80mg ve üzeri	kardiolog / kalp damar cerrahı / endokrinolog	kardiolog / kalp damar cerrahı / endokrinolog

4.2.28.B - Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestimamin)

	TG >500 mg/dL		yok		tek tahlil sonucu yeterli	yok		
statin dışı lipid düşürücü	TG >200 mg/dL		yok		tek tahlil sonucu yeterli	Diabetes mellitus veya Akut koroner sendrom veya Geçirilmiş MI veya Geçirilmiş inme veya Koroner arter hastalığı veya Periferik arter hastalığı veya Karatid arter hastalığı veya Abdominal aort anevrizması	kardiolog/ kalp damar cerrahı/ endokrinolog/ dahiliye/nöroloji	tüm hekimler

4.2.28.C - Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil)

Ezetimi	En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL'nin üzerinde kalan (raporda yazacak) veya Kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst sınırının en az 2 kat üzerine çıkması ve bu sebeple statin kullanamaması (raporda yazacak) veya Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT ya da ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ve bu sebeple statin kullanamaması (raporda yazacak) hallerinde						kardiolog/ dahiliye/ nörolog /kalp damar cerrahı	tüm hekimler
---------	---	--	--	--	--	--	--	--------------

4.2.28.Ç - Niasin

Niasin	LDL >100 mg/dL	En az 6 ay süreyle statin aldığı halde, LDL düzeyinin 100 mg/dL'nin üstünde olduğu ve				Diabetes mellitus veya Akut koroner sendrom veya Geçirilmiş MI veya Geçirilmiş inme veya Koroner arter hastalığı veya Periferik arter hastalığı veya Karatid arter hastalığı veya Abdominal aort anevrizması	kardiolog / dahiliye	tüm hekimler
	TG >500 mg/dL	TG 500 mg/dL'nin üstünde olduğu durumlarda tek başına veya fibratik asit türevi ile kombine olarak				-		
	TG >200 mg/dL	TG 200 mg/dL'nin üstünde olduğu DM hastalığı varlığında tek başına veya fibratik asit türevi ile kombine olarak				Diabetes mellitus hastalığı		

RAPOR YENİLEME:

daha önce alınmış ilacın teminine esas olan **bir önceki raporun düzenlenme tarihi** veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.

STATIN kullanan Hastalarda Tedaviye 6 ay ve daha uzun süre ara verilmişse devam raporunda yeniden başlangıç kriterleri aranır. (15.10.2016 itibarıyla)

Tablolara ve içeriğinden yazar veya yayıncıların resmi hiç bir yükümlülüğü yoktur. Güncelleme tarihi 15/10/2016 eczahmetcetiner@gmail.com