

**4.2.15.E-Tikagrelor; BRILINTA ®**

(1) Akut koroner sendromlu hastalardan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü [NSTEMI] veya ST yükselmeli miyokard enfarktüsü [STEMI] olan ve acil servise müracaat etmiş hastalarda;

(2) Tikagrelor başlanmadan önceki 72 saat içinde hastaneye yatırılmış olması ve acil tedavide fibrinolitik tedavi uygulanmamış olması,

(3) Hastanın varfarin tedavisi altında olmaması,

(4) Aşağıdaki durumlardan birinin mevcut olması;

a) EKG'de en az iki ardışık derivasyonda 1mm ve üzeri persistan ST segment yükselme göstermesi ve troponin/CK-MB pozitif olması (STEMI) veya,

b) Persistan göğüs ağrısı bulunması ve EKG'de en az iki ardışık derivasyonda 1mm den derin ST depresyonu veya R dalgasının dominant olduğu en az iki ardışık derivasyonda 1mm den derin T negatifliği veya persistan olmayan ST segment yükselmesi göstermesi ve miyokard nekrozunu gösteren troponin/CK-MB pozitif olması (NSTEMI),

(5) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan koşulların tamamını gösteren hastalarda bu durumların belirtildiği kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinden birinin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçetelenir. Tedavi süresi 1 yıldır (13 kutu). İlacın hastaya tekrar kullanımı ancak hastada aynı koşulların yeniden oluşması halinde mümkündür.

**04.02 - Koroner arter hastalığı(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9)**

1- TANI	STEMI	-	EKG'de en az iki ardışık derivasyonda 1mm ve üzeri persistan ST segment yükselme olacak	Ayrıca troponin/CK-MB pozitif olacak
	NSTEMI	Persistan göğüs ağrısı olacak ve	EKG'de en az iki ardışık derivasyonda 1mm den derin ST depresyonu göstermesi veya	Ayrıca troponin/CK-MB pozitif olacak
			R dalgasının dominant olduğu en az iki ardışık derivasyonda 1mm den derin T negatifliği olması veya	
persistan olmayan ST segment yükselmesi göstermesi olacak				
2	AKS (akut koroner Sendrom teşhisi) olacak			
3	Acil Servise Müracaat etmiş olacak			
4	tikagrelor başlanmazdan 72 saat önce hastaneye yatmış olacak			
5	acilde fibrinolitik tedavi uygulanmamış olacak			
6	varfarin tedavisi altında olmayacak			
7	Rapor: kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi uzmanı içeren SKR			
8	Reçete: kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi uzmanı ya da iç HU			
9	tedavi süresi max 1 yıl (13 Kutu)			
*	İlacın hastaya tekrar kullanımı ancak hastada aynı koşulların yeniden oluşması halinde mümkündür.			