



ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI KULLANIM İLKELERİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME
ÜRÜNLERİ VERİLME İLKELERİ (4.2.8)

FORTİNİ MULTİ FİBRE –
FORTİNİ
PEDIASURE-PEDIASURE PLUS
NUTRİNİ
INFATRİNİ
SİMİLAC HIGH ENERGY
PROTİFAR
FANTOMALT
MODULEN IBD

Çocuk veya yetişkin hastada **malnütrisyon gelişmesi** halinde enteral beslenme ürünleri verilir.

EK4/F-13. Her türlü enteral ve parenteral beslenme ürünleri
(SUT'un 4.2.8 numaralı maddesinde yer alan esaslara göre)



OCUKLUK YA GRUBUNDA MALNUTRİSYON TANIMI

2 Ya altı bebekler için yaşa göre ađırlık (<-2SD) raporda belirtilmelidir.

2 Ya ve üzeri çocuklar için vcut ktle indeksi (VKİ) (<-2SD) olduđu raporda belirtilmelidir.

OCUKLUK YA GRUBUNDA **MALNUTRİSYON KOULLARININ ARANDIĐI** DURUMLARDA

	Rapor Sresi	Rapor Dzenleyecek Hekim	Rapor Dzenlenme Tr	Reete Yazabilecek Hekim
Başlangıç Raporu	6 ay	ocuk Hastalıkları Uzman Hekimi	Uzman Hekim Raporu	Tm Hekimler
Devam Raporu	6 ay	ocuk Gastroenteroloji, ocuk Nroloji, ocuk Metabolizma, ocuk Endokrin ve Metabolizma Uzman Hekimi	Uzman Hekim Raporu	Tm Hekimler



ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA

Malnütrisyon koşullarının aranmadığı durumlar;

- ✓ Yatan Hastalar
- ✓ Doğuştan Metabolik Hastalığı Olanlar
- ✓ Kanser Hastaları
- ✓ Kistik Fibrozis
- ✓ Crohn Hastaları
- ✓ Yanık Hastaları
- ✓ Orogastrik Sonda/Nazogastrik Sonda/Nazoenterik Sonda ile beslenen
- ✓ Gastrostomi/Jejunostomi ile beslenen hastalar

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA MALNUTRISYON KOŞULLARININ ARANMADIĞI DURUMLARDA

	Rapor Süresi	Rapor Düzenleyecek Hekim	Rapor Düzenlenme Türü	Reçete Yazabilecek Hekim
Başlangıç Raporu	6 ay	Uzman Hekim	Sağlık Kurulu Raporu	Tüm Hekimler
Devam Raporu	6 ay	Uzman Hekim	Sağlık Kurulu Raporu	Tüm Hekimler



ÇOCUKLUK YAŞ GRUBU RAPORLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Sağlık Kurulu Raporunda;

- ✓ Beslenme ürününün ticari adı (örn: pediasure plus, fiber vs ayrı ayrı)
 - ✓ Günlük kalori ihtiyacı
 - ✓ Günlük kullanım miktarı
 - ✓ Hastanın vücut ağırlığı
 - ✓ Hastanın boyu
 - ✓ Yaşa göre ağırlık SD veya VKİ değerleri
- ★ açıkça belirtilerek en fazla **30 günlük dozda** reçete edilir.



YETİŞKİN HASTALARDA(18 YAŞ VE ÜZERİNDE) MALNÜTRİSYON TANIMI OLARAK RAPOR AÇIKLAMALARINDA BELİRTİLECEK İFADELER:

1.	*Son 6 ayda %5 den fazla istemsiz kilo kaybı veya *6 aydan uzun sürede ise %10 dan fazla istemsiz kilo kaybı veya *70 yaş ve üzerinde VKİ 22'nin altında veya *70 yaş altında ise VKİ 20'nin altında
2.	Malnutrisyona neden olan eşlik eden hastalık veya travma
3.	Besin alımında azalma *1 hafta süreyle enerji ihtiyacının %50 sinden az alım veya *2 hafta süreyle alımda herhangi bir azalma veya *Besin sindirimini/emilimini bozan herhangi bir gastrointestinal sistem hastalığı

X Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir

Malnütrisyon koşulu aranan endikasyonlarda, her 3 tanımın beraber sağlık kurulu raporlarında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir

YETİŞKİNLERDE MALNUTRİSYON KOŞULU **ARANDIĞI** DURUMLARDA

Başlangıç Raporu	Devam Raporu	Rapor Düzenlenme Türü	Rapor Düzenleyecek Hekim	Kalori Kısıtlaması
3 AY	3 AY	Sağlık Kurulu Raporu	Uzman Hekim	<u>1200 KCAL</u>



YETİŞKİN HASTALARDA

Malnütrisyon koşullarının aranmadığı durumlar

- ✓ Yatan Hastalar
- ✓ Kanser Hastaları
- ✓ Tüp ile Beslenen Hastalar

(Orogastrik Sonda/Nazogastrik Sonda/Nazoenterik Sonda veya Gastrostomi/Jejunostomi/Gastrojejunostomi ile beslenen hastalar)

YETİŞKİNLERDE MALNUTRISYON KOŞULLARININ ARANMADIĞI DURUMLARDA

Başlangıç Raporu	Devam Raporu	Rapor Düzenlenme Türü	Rapor Düzenleyecek Hekim	Reçete Yazabilecek Hekim	Kalori Kısıtlaması
6AY	6 AY	SAĞLIK KURULU RAPORU	UZMAN HEKİM	TÜM HEKİMLER	YOK



YETİŞKİN HASTA RAPORLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

➔ ➔ Sağlık Kurulu Raporunda;

- ✓ Beslenme ürününün ticari adı (örn: pediasure plus, fiber vs ayrı ayrı)
 - ✓ Günlük kalori ihtiyacı
 - ✓ Günlük kullanım miktarı
 - ✓ Hastanın vücut ağırlığı
 - ✓ Hastanın boyu
 - ✓ Yaşa göre ağırlık SD veya VKİ değerleri
 - ✓ **Varsa eşlik eden hastalığın ICD kodu**
- ★ açıkça belirtilerek en fazla **30 günlük dozda** reçete edilir.